

GUAYACÁN, GUAYACÁN DE MANIZALES

Árboles de corteza exterior gris y fisurada. Flores amarillas o verde amarillentas, solitarias. Frutos verdes que se tornan rojizos al madurar.

Nombre Científico: *Lafoensia puniceifolia*

Origen: Originario del continente americano. Naturalmente se encuentra en las cordilleras de los Andes, en Colombia, Ecuador y Perú.



Luz: Interior y exterior. Se puede ubicar dentro de las casas, pero debe estar en un lugar bien iluminado y aireado (cerca de una ventana).



Agua: Los riegos deben ser a fondo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra como dejarla totalmente seca. (Generalmente se riega día de por medio. En días muy soleados una vez por día). Las hojas tiernas se deshidratan rápidamente ante la falta de humedad, viento y sol fuerte.



Abono: Se puede aplicar abono foliar cada 20 días. De igual manera se puede aplicar un triple 15 en mínimas cantidades (una pizca alrededor del matero) cada dos meses.



Trasplante: Cada 2 o 3 años. Hay que podar las raíces durante el trasplante, unos 2/3 tercios del cepellón, pero evitando cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas tras la poda, aprovechando esta operación para podar las ramas no deseadas.



Poda: Debido a su rápido crecimiento, los brotes nuevos deben pinzarse con frecuencia durante la época vegetativa, cuando aún están tiernos. Para mantener un follaje compacto podar preferiblemente en luna menguante.



Cuidado con: Nunca exponer al sol directo, ya que el sol fuerte quema las hojas. El exceso de riego o agua estancada puede matarlo.



¿Sabías qué? Se desarrolla desde los 1.500 a 2.800 m.s.n.m., sin embargo, tolera muy bien las altas temperaturas y se puede cultivar incluso al nivel del mar.